

USAGE  
PRO.

BLATTES  
GERMANIQUES

BLATTES  
ORIENTALES

...



#### PRODUIT BIOCIDÉ

TP 18  
N° AMM FR-2022-0059

#### USAGES :

Intérieur et extérieur.

#### ACTION ET TRAITEMENT :

Insecticide de contact,  
action rémanente

#### CONTIENT :

Terre de diatomée (dioxyde  
de silicium kieselguhr - cas n°  
61790-53-2) : 7,20% m/m

#### DURÉE DE

#### CONSERVATION :

2 ans

#### AVERTISSEMENT :


Attention



#### CONDITIONNEMENT :

Aérosol de 500 ml,  
carton de 12

# DIATOBUG



Diatobug est une formulation insecticide à base de Terre de Diatomée (Kieselguhr) destinée à combattre la blatte germanique (*blattella germanica*) et la blatte orientale (*blatta orientalis*), nymphes et adultes.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Il s'utilise à l'intérieur des locaux (zones industrielles, collectivités, maisons privées).

#### DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Le produit se pulvérise sur le passage des insectes et laisse après séchage une poudre. Cette poudre adhère au corps des insectes par simple contact et provoque une déshydratation conduisant à la mort.

#### Dose d'emploi :

##### Prêt à l'emploi ; 150 ml (environ 9 -10 g/m<sup>2</sup>).

Avant l'utilisation, agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décolllement de la bille.

Bien agiter l'aérosol avant et pendant l'utilisation.

Appliquer dans les fissures et crevasses et les espaces vides où les insectes peuvent se cacher.

Appliquer sur les chemins des insectes. Appliquer directement sur les insectes lorsque cela est possible.

Pulvériser à une distance de 30 cm, l'application du produit génère un revêtement uniforme qui sèche rapidement et laisse une surface de poussière blanche uniforme.

En raison du mode d'action lent du produit, la réduction de l'infestation est visible en 1 semaine.

Si nécessaire, renouveler l'opération tous les 7 jours.

Purger l'aérosol tête en bas après utilisation pour dégager la valve et le diffuseur de tout résidu de poudre. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

#### PRÉCAUTION D'EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION

##### Manipulation :

Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.

Ne pas utiliser en présence de denrées ou d'appareils servant à leur préparation.

Les recommandations d'utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement respectées.

##### Stockage :

Conserver le produit fermé et dans son emballage d'origine.

Conserver dans un endroit bien ventilé et protégé du gel.

Garder au frais. Protéger de la lumière directe du soleil.

Durée de stockage : 24 mois.

##### Déchets :

Éliminer le produit et son emballage comme un déchet industriel dangereux.

Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

Le recyclage de l'emballage est interdit.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet :*

*www.edialux.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : info@edialux.fr*

 **EDIALUX**  
PRODUITS PROFESSIONNELS

USAGE  
PRO.

INSECTES  
RAMPANTS  
dont :  
BLATTES  
FOURMIS  
POUX ROUGES



PRODUIT BIOCIDÉ  
TP 18

USAGES :  
Intérieur et extérieur des  
bâtiments.

ACTION ET TRAITEMENT :  
Dessiccation des arthropodes

CONTIENT :  
Dioxyde de silicium  
kieselguhr


DURÉE DE  
CONSERVATION :  
24 mois

AVERTISSEMENT :



CONDITIONNEMENT :  
Seau de 2 kg

# FOR BUG® P INSECTOSEC



*FOR BUG P est une formulation insecticide à base de Terre de Diatomée (Kieselguhr), destinée à combattre tous les insectes rampants dont la blatte germanique (blattella germanica) et la blatte orientale (blatta orientalis), la fourmi noire des jardins (Lasius niger) et les poux rouge (Dermapyssus gallinae). Ce produit à usage professionnel s'utilise à l'intérieur des poulaillers, dans les zones industrielles, collectivités et dans les maisons privées.*

## DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Pour les insectes rampants, le produit peut être appliqué par pulvérisation ou par poudrage par versement (traitement en barrière contre les rampants), ne pas appliquer sur les surfaces très poreuses.

- **Traitement contre les insectes rampants dont les blattes** : appliquer sur les surfaces, fissures et crevasses et les chemins des insectes. Pour les applications par pulvérisation : 7 g/m<sup>2</sup>

- **Traitement contre les fourmis** : appliquer sur les chemins des fourmis, autour de l'entrée des nids. Pour les applications par pulvérisation : 7 g/m<sup>2</sup>

**Pour les traitements en barrière** : 7 g/m largeur de 1 à 3 cm, fréquence tous les 7 jours. Pour les traitements en saupoudrage des nids : 5 g/m

- **Contre les poux rouges** : le produit est appliqué uniquement en pulvérisation sur les surfaces, et notamment dans les endroits où les poux rouges peuvent se cacher.

Dose d'emploi pour le pou rouge des volailles : 50 g/m<sup>2</sup>

- **En préventif**, appliquer le produit sur des surfaces propres et sèches avant l'entrée des animaux. Pulvériser suffisamment de produit pour recouvrir toutes les surfaces d'un film blanc (50 g/m<sup>2</sup>).

- **En curatif**, appliquer sur des surfaces infestées en l'absence d'animaux. Pulvériser suffisamment de produit pour recouvrir toutes les surfaces d'un film blanc (50 g/m<sup>2</sup>).

- Appliquer directement sur les insectes lorsque cela est possible.

- Si nécessaire, réappliquer après 7 jours.

- L'efficacité peut être observée dans un délai de 1-3 semaines.

Il est recommandé de procéder régulièrement à un contrôle de prévention dans les zones les plus sensibles à la contamination. Après un traitement réussi, n'éliminez pas la couche poudreuse, elle assurera un contrôle préventif sur le long terme. Renouvelez l'application dans le cas d'une nouvelle contamination, de forte humidité. Pour des raisons d'hygiène et de salubrité, enlevez les insectes morts après le traitement.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI - STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Porter un équipement de protection respiratoire avec un facteur de protection assigné de minimum 40 (masque FFP3). Porter des gants résistants aux produits chimiques. Une combinaison de protection (au minimum de catégorie III type 6) doit être portée. Porter un écran/visière.

### Élimination - Stockage

Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur. Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans un circuit de collecte approprié.

### Conditions de stockage et durée de conservation :

Conserver le produit fermé et dans son emballage d'origine.

Conserver dans un endroit sec.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet : [www.edialux.fr](http://www.edialux.fr) ou en faire la demande à l'adresse suivante : [info@edialux.fr](mailto:info@edialux.fr).*